

# Antiscabiosum® 25 %

Emulsion mit Benzylbenzoat  
zur Anwendung bei Erwachsenen

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Antiscabiosum 25 % jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach 3 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

## Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Antiscabiosum 25 % und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Antiscabiosum 25 % beachten?
3. Wie ist Antiscabiosum 25 % anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Antiscabiosum 25 % aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

### 1. Was ist Antiscabiosum 25 % und wofür wird es angewendet?

#### Was ist Antiscabiosum 25 %?

Es ist ein antiparasitäres Mittel zur Anwendung auf der Haut.

#### Wofür wird es angewendet?

Antiscabiosum 25 % wird zur Behandlung von Krätze (Scabies) bei Erwachsenen angewendet, als weniger toxisches Mittel, alternativ zu ausreichend untersuchten Antiscabiosen.

### 2. Was müssen Sie vor der Anwendung beachten?

#### a. Nicht anwenden

Wann dürfen Sie Antiscabiosum 25 % nicht anwenden? Antiscabiosum 25 % darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Benzylbenzoat, Benzoessäure und Benzylalkohol oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels sind. Diese sonstigen Bestandteile sind unter 6. Weitere Informationen aufgelistet.
- während der Stillzeit.

Antiscabiosum 25 % darf nicht mit den Augen, den Schleimhäuten und stark irritierter Haut in Berührung kommen.

#### b. Vorsichtsmaßnahmen

Wann ist besondere Vorsicht bei der Anwendung erforderlich?

- Beim Auftragen der Emulsion: Antiscabiosum 25 % darf nicht mit den Augen, den Schleimhäuten und stark irritierter Haut in Berührung kommen.
- Vermeiden Sie während der Anwendung intensive Sonnenbestrahlung (z. B. auch das Solarium).
- Sollten nach der Behandlung die Beschwerden dauerhaft fortbestehen, halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrem Arzt. Eine weitere Therapie darf nur mit ärztlicher Zustimmung durchgeführt werden.

#### Was ist bei Kindern zu beachten?

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden. Für Kinder steht ein Präparat mit einem geringeren Wirkstoffgehalt zur Verfügung.

#### Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

#### Schwangerschaft

In Tierstudien wurde Benzylbenzoat nur unzureichend untersucht. Es liegen keine Erfahrungen mit einer Anwendung von Benzylbenzoat in der Schwangerschaft vor. Daher dürfen Sie Antiscabiosum 25 % in der Schwangerschaft nur anwenden, wenn Ihr behandelnder Arzt dies unter Abwägung aller Risiken für zwingend erforderlich hält.

#### Stillzeit

Es liegen keine Daten darüber vor, ob der Wirkstoff Benzylbenzoat in die Muttermilch übertritt. Deshalb soll Antiscabiosum 25 % während der Stillzeit nicht angewendet werden (siehe auch 2a. Nicht anwenden).

#### Welche Auswirkungen hat Antiscabiosum 25 % auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen?

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

#### c. Wechselwirkungen

Arzneimittel können sich gegenseitig beeinflussen, so dass ihre Wirkung dann stärker oder schwächer ist als gewöhnlich.

Bisher sind keine Wechselwirkungen von Antiscabiosum und einem anderen Arzneimittel bekannt. Antiscabiosum 25 % sollte nicht gleichzeitig mit anderen Krätzemitteln angewendet werden, um mögliche Wechselwirkungen auszuschließen. Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

#### d. Hinweise

#### Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Antiscabiosum 25 %

Cetylstearylalkohol kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis) hervorrufen. Propylenglycol kann Hautreizungen hervorrufen.

### 3. Wie ist Antiscabiosum 25 % anzuwenden?

Antiscabiosum 25 % ist zur Anwendung bei Erwachsenen bestimmt. Für Kinder steht ein Präparat mit einem geringeren Wirkstoffgehalt zur Verfügung. Wenden Sie Antiscabiosum 25 % immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

## Wie und wie oft sollten Sie Antiscabiosum 25% anwenden?

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Emulsion 1-mal täglich an 3 aufeinander folgenden Tagen auf die Haut auftragen.

Danach beenden Sie bitte die Behandlung, auch wenn der Juckreiz noch weiter besteht. Suchen Sie einen Arzt auf. Eine ärztliche Nachkontrolle über den Erfolg oder Misserfolg der Krätzebehandlung ist grundsätzlich erforderlich.

Vor Beginn der Krätzekur reinigen Sie Ihren Körper gründlich (Vollbad/Dusche etc.). An drei aufeinander folgenden Tagen, jeweils abends, reiben Sie den Körper vom Hals bis zu den Zehen sorgfältig mit Antiscabiosum 25% ein. Tragen Sie die Emulsion dünn auf und verteilen Sie sie gleichmäßig, so wie Sie es auch mit einem Sonnenschutzmittel tun würden.

Die sichtbar befallenen Hautstellen behandeln Sie bitte besonders gründlich. Reiben Sie sorgfältig jeden Finger, jede Zehe und deren Zwischenräume ein, alle Körperfalten, die Areale um Brust und Genitalien, die Gürtel- und Gesäßgegend. Diese Stellen werden von Krätzemilben bevorzugt befallen.

Am vierten Tag nehmen Sie dann ein Vollbad oder seifen sich unter der Brause ab. Wechseln Sie die Bett- und Leibwäsche. Die zuvor getragene Oberbekleidung lüften Sie bitte 4 Tage aus oder bügeln sie heiß von innen.

## Wie lange dürfen Sie Antiscabiosum 25% anwenden? Drei aufeinander folgende Tage.

Wenden Sie Antiscabiosum 25% ohne ärztlichen Rat nicht länger als 3 Tage an. Eine Nachbehandlung eines etwaigen weiter bestehenden Juckreizes ist nach Rücksprache mit einem Arzt möglicherweise erforderlich.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Antiscabiosum 25% zu stark oder zu schwach ist.

## Was ist bei Anwendungsfehlern zu tun?

1. Wenn Sie eine zu große Menge Antiscabiosum 25% aufgetragen haben, nehmen Sie den Überschuss mit einem Tuch von der Haut ab. Überdosierungen sind nicht bekannt.

2. Wenn Sie die Anwendung von Antiscabiosum 25% einmal vergessen haben, wenden Sie am nächsten Tag nicht die doppelte Dosis an. Halten Sie unverzüglich Rücksprache mit Ihrem Arzt. Er wird entscheiden, wie Sie die Behandlung fortsetzen sollen.

3. Wenn Sie die Anwendung von Antiscabiosum 25% abbrechen, wird die Krätzemilbe sich erholen und Ihre ursprünglichen Beschwerden werden erneut auftreten.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

## 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Antiscabiosum 25% Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig: mehr als 1 von 10 Behandelten  
Häufig: weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten  
Gelegentlich: weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1000 Behandelten  
Selten: weniger als 1 von 1000, aber mehr als 1 von 10 000 Behandelten  
Sehr selten: weniger als 1 von 10 000 Behandelten oder unbekannt

## Mögliche Nebenwirkungen

Selten treten Reizungen von Haut und Schleimhäuten oder ein weiter bestehender Juckreiz auf.

In Einzelfällen kommt es zu Überempfindlichkeitsreaktionen, die sich in Unwohlsein, Nesselsucht und Gefäßödemen sowie einer berührungsempfindlichen, entzündlichen Hautreaktion äußern.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

## 5. Wie ist Antiscabiosum 25% aufzubewahren?

### Aufbewahrungsbedingungen

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht über 25 °C lagern.

### Haltbarkeit

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Dieses Datum ist auf dem Etikett und der Faltschachtel nach <Verwendbar bis> angegeben. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Nach der 3-tägigen Anwendung in der Flasche verbleibende Reste sind nicht zur weiteren Verwendung bestimmt.

## 6. Weitere Informationen

### Was Antiscabiosum 25% enthält

100 g Emulsion enthalten als Wirkstoff 25 g Benzylbenzoat.

Die sonstigen Bestandteile sind: emulgierender Cetylstearylalkohol (Typ A) (Ph. Eur.), Propylenglycol, Sorbitol 70 %, gereinigtes Wasser

### Wie Antiscabiosum 25% aussieht und Inhalt der Packung

Antiscabiosum ist eine weiße Emulsion. Sie ist in Braunglasflaschen abgefüllt, die in Faltschachteln gestellt sind. Es gibt eine Packungsgröße mit 200 g Emulsion (N2).

### Pharmazeutischer Unternehmer

Strathmann GmbH & Co. KG

Postfach 610425

22424 Hamburg

Tel: 040/55 90 5-0

Fax: 040/55 90 5-100

### Hersteller

Biokirch GmbH

Bei den Kämpfen 11

21220 Seevetal

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im März 2008

13/028-00111

## Wichtiger Hinweis

Die Kontaktpersonen von Krätzepatienten müssen unbedingt untersucht werden. Da der Juckreiz erst etwa 3 bis 5 Wochen nach der Ansteckung auftritt, ist eine Mitbehandlung der Menschen nächster Umgebung (Familienmitglieder, Freunde) unbedingt notwendig. Dadurch können mögliche, noch nicht entdeckte Infektionen kuriert und die Weitergabe der Krätze oder eine erneute Ansteckung vermieden werden.

Für Kinder steht ein Präparat mit geringerem Wirkstoffgehalt zur Verfügung.